

2016年4月27日

報道関係各位

東和薬品株式会社

**持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤  
 カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg 「トーワ」 および  
 カンデサルタン OD 錠 2mg/4mg/8mg 「トーワ」  
 「効能・効果」「用法・用量」の追加に関するお知らせ  
 —先発医薬品との適応不一致が解消—**

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg 「トーワ」（2014年12月発売）およびカンデサルタン OD 錠 2mg/4mg/8mg（2015年6月発売）の効能・効果および用法・用量の追加が4月27日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、本製品の先発医薬品との適応不一致は解消されました。有効成分であるカンデサルタン シレキセチルは、ARB（アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤）の中で唯一、慢性心不全（軽症～中等症）の患者さんで ACE 阻害剤の投与が適切でない場合に適応があり、特許期間満了に伴い今回ジェネリック医薬品である当社製品にもその適応が追加されました。

《改訂内容》

カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg 「トーワ」・カンデサルタン OD 錠 2mg/4mg/8mg 「トーワ」

改訂後（下線部改訂）	改訂前
<b>【効能・効果】</b> 高血圧症 腎実質性高血圧症 <u>下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合</u> <u>慢性心不全（軽症～中等症）</u>	<b>【効能・効果】</b> 高血圧症 腎実質性高血圧症
<b>【用法・用量】</b> 高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mg を経口投与し、必要に応じ12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mg から投与を開始し、必要に応じ8mg まで増量する。	<b>【用法・用量】</b> 高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mg を経口投与し、必要に応じ12mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mg から投与を開始し、必要に応じ8mg まで増量する。

改訂後（下線部改訂）	改定前
<p>腎実質性高血圧症</p> <p>通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。</p> <p><u>下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合</u></p> <p><u>慢性心不全（軽症～中等症）</u></p> <p><u>通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量できる。</u></p> <p><u>なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。</u></p>	<p>腎実質性高血圧症</p> <p>通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。</p>

以上

## 《会社概要》

- 社名 東和薬品株式会社
- 本社 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号
- 代表者名 代表取締役社長 吉田逸郎
- 事業内容 医療用医薬品（ジェネリック医薬品）の製造・販売
- 自社製品数 692品目（平成27年12月現在）
- 従業員数 2,232名（平成28年4月1日現在）

## ＜お問い合わせ先＞

東和薬品株式会社 広報室  
 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号  
 TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-6908-6060  
 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp