



2019年3月27日

報道関係各位

東和薬品株式会社

**ドネペジル塩酸塩錠 3mg/5mg/10mg「トーワ」、
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg/5mg/10mg「トーワ」および
ドネペジル塩酸塩内用液 3mg/5mg/10mg「トーワ」
「効能・効果」「用法・用量」の追加承認取得のお知らせ**

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、ドネペジル塩酸塩錠 3mg/5mg/10mg「トーワ」、ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg/5mg/10mg「トーワ」およびドネペジル塩酸塩内用液 3mg/5mg/10mg「トーワ」における「レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制」の効能・効果および用法・用量の追加が本日3月27日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品（アリセプト錠 3mg/5mg/10mg、アリセプト D 錠 3mg/5mg/10mg、アリセプト内服ゼリー 3mg/5mg/10mg）との適応不一致が解消され、同様の処方・調剤が可能となります。

レビー小体型認知症に対する適応を取得している有効成分は、国内ではドネペジル塩酸塩のみとなっております。

《改訂内容》

ドネペジル塩酸塩錠 3mg/5mg/10mg「トーワ」、ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg/5mg/10mg「トーワ」、ドネペジル塩酸塩内用液 3mg/5mg/10mg「トーワ」

効能・効果 (下線部改訂)	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制
用法・用量 (下線部改訂)	<p>アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制</p> <p>通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。</p> <p>レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制</p> <p>通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により5mgまで減量できる。</p>

以上

＜お問い合わせ先＞

東和薬品株式会社 広報・IR室 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号
TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-6908-6060 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp