



2019年6月18日

報道関係各位

東和薬品株式会社

**メトトレキサートカプセル 2mg「トーワ」および
メトトレキサート錠 2mg「トーワ」
「効能・効果」「用法・用量」の追加承認取得のお知らせ**

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、メトトレキサートカプセル 2mg「トーワ」、メトトレキサート錠 2mg「トーワ」における「局所療法で効果不十分な尋常性乾癬」「関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症」の効能・効果および用法・用量の追加が本日6月18日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品リウマトレックスカプセル 2mg との適応不一致が解消され、同様の処方・調剤が可能となりました。

《改訂内容》

メトトレキサートカプセル 2mg「トーワ」

メトトレキサート錠 2mg「トーワ」

効能・効果 (下線部改訂)	<p>関節リウマチ</p> <p><u>局所療法で効果不十分な尋常性乾癬</u></p> <p><u>関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症</u></p> <p>関節症状を伴う若年性特発性関節炎</p>
用法・用量 (下線部改訂)	<p>関節リウマチ</p> <p><u>局所療法で効果不十分な尋常性乾癬</u></p> <p><u>関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症</u></p> <p>通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし、1週間単位の投与量を1回又は2～3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。</p> <p>なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが、1週間単位の投与量として16mgを超えないようにする。</p> <p>関節症状を伴う若年性特発性関節炎</p> <p>通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして4～10mg/m²とし、1週間単位の投与量を1回又は2～3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。</p> <p>なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減する。</p>

以上

1 / 1