



2019年11月13日

報道関係各位

東和薬品株式会社

**ピタバスタチン Ca・OD錠 1mg/2mg 「トーフ」 および  
ピタバスタチン Ca錠 1mg/2mg 「トーフ」  
「家族性高コレステロール血症の小児用法」の追加承認取得のお知らせ**

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、ピタバスタチン Ca・OD錠 1mg/2mg 「トーフ」 およびピタバスタチン Ca錠 1mg/2mg 「トーフ」における「家族性高コレステロール血症の小児用法」の追加が本日 11月13日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品リバロ OD錠 1mg/2mg およびリバロ錠 1mg/2mg との適応不一致が解消され、同様の処方・調剤が可能となりました。

《改訂内容》

ピタバスタチン Ca・OD錠 1mg/2mg 「トーフ」

ピタバスタチン Ca錠 1mg/2mg 「トーフ」

効能・効果 (変更なし)	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症
用法・用量 (下線部改訂)	<p><u>高コレステロール血症</u> 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p> <p><u>家族性高コレステロール血症</u> <u>成人</u>：通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p> <p><u>小児</u>：通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。 なお、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。</p>

以上

＜お問い合わせ先＞

東和薬品株式会社 広報・IR室 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-6908-6060 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp