



2020年8月5日

報道関係各位

東和薬品株式会社

## アリピプラゾール製剤の「効能・効果」「用法・用量」 追加承認取得のお知らせ

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、アリピプラゾール錠 3mg/6mg/12mg/24mg「トーワ」、アリピプラゾール OD 錠 3mg/6mg/12mg/24mg「トーワ」、アリピプラゾール散 1%「トーワ」、アリピプラゾール内用液 3mg/6mg/12mg 分包「トーワ」の効能・効果および用法・用量の追加が、本日 8 月 5 日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、24mg 製剤は先発医薬品（エビリファイ錠 24mg およびエビリファイ OD 錠 24mg）との適応不一致が解消され、同様の処方・調剤が可能となります。その他の規格については、先発医薬品と効能・効果および用法・用量は一致しておりません。

### 《改訂内容》

アリピプラゾール錠 3mg/6mg/12mg/24mg「トーワ」

アリピプラゾール OD 錠 3mg/6mg/12mg/24mg「トーワ」

アリピプラゾール散 1%「トーワ」

アリピプラゾール内用液 3mg/6mg/12mg 分包「トーワ」

効能・効果 (下線部改訂)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統合失調症</li> <li>・ 双極性障害における躁症状の改善</li> </ul>
用法・用量 (下線部改訂)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統合失調症 通常、成人にはアリピプラゾールとして 1 日 6～12mg を開始用量、1 日 6～24mg を維持用量とし、1 回又は 2 回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 30mg を超えないこと。</li> <li>・ 双極性障害における躁症状の改善 <u>通常、成人にはアリピプラゾールとして 12～24mg を 1 日 1 回経口投与する。</u> <u>なお、開始用量は 24mg とし、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 30mg を超えないこと。</u></li> </ul>

以上

### ＜お問い合わせ先＞

東和薬品株式会社 広報・IR室 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-7177-4960 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp