

2021年6月30日

報道関係者各位

東和薬品株式会社

デュロキセチン錠 20mg/30mg「トーフ」
デュロキセチンカプセル 20mg/30mg「トーフ」の
「効能・効果」「用法・用量」の追加承認取得のお知らせ

東和薬品株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎）は、デュロキセチン錠 20mg/30mg「トーフ」^{※1}、デュロキセチンカプセル 20mg/30mg「トーフ」^{※2}の「効能・効果」「用法・用量」の追加が、本日6月30日付で承認されましたので、お知らせいたします。

これにより、先発医薬品（サインバルタカプセル 20mg/30mg）と「効能・効果」「用法・用量」の適応不一致が解消されます。

<<改訂内容>>

デュロキセチン錠 20mg/30mg「トーフ」

デュロキセチンカプセル 20mg/30mg「トーフ」

効能・効果 (下線部改訂)	○うつ病・うつ状態 ○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症 <u>慢性腰痛症</u> <u>変形性関節症</u>
用法・用量 (下線部改訂)	<うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛> 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして40mgを経口投与する。 投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。 なお、効果不十分な場合には、1日60mgまで増量することができる。 <線維筋痛症に伴う疼痛、慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛> 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。 投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。

※1・※2 2021年6月薬価基準追補収載、発売準備中

以上

<お問い合わせ先>

東和薬品株式会社 広報・IR室

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

TEL: 06-6900-9102 / FAX: 06-7177-4960 E-mail: kouhou@towayakuhin.co.jp